



## **Prehydratie bij shuntogram en shuntdotter**

Bij een shuntogram maakt de radioloog na toediening van contrastvloeistof foto's van uw shunt.

Tijdens dit onderzoek wordt contrastvloeistof ingespoten. Dit is mogelijk schadelijk voor uw nieren. Als u nog meer dan een halve liter plast, worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Op deze manier wordt voorkomen dat de nierfunctie door de contrastvloeistof verder achteruit gaat.

Een van de maatregelen is dat vooraf een infuus krijgt.

### **Vorbereiding**

In verband met het infuus wordt u 2 uur vóór het shuntogram opgenomen op de dagbehandeling A3-4, bestemming 65.

Een verpleegkundige brengt een infuusnaald in in de niet-shunt-arm waarna u gedurende een uur via het infuus een vloeistof krijgt toegediend. Deze vloeistof is een oplossing met een geringe hoeveelheid zout of natriumbicarbonaat.

Ook krijgt u nog premedicatie op de dagbehandeling.

Vanaf het moment van opname moet u nuchter blijven.

De afdeling radiologie belt naar de dagbehandeling als u kunt komen. U wordt met een rolstoel in uw gewone kleding naar de katheterisatie-kamer gebracht.

### **Na het onderzoek**

Na afloop van het onderzoek haalt de verpleegkundige van de dagbehandeling u weer op. Nadat u uw persoonlijke bezittingen heeft gepakt wordt u naar de dialyseafdeling gebracht om te dialyseren.

Na de dialyse kunt u dan in de meeste gevallen naar huis