

CEFTRIAXON (ROCEPHIN)

- Afleveringsvorm** Injectieflacon met 1 gram ceftriaxon (natriumzout).
Injectieflacon met 2 gram ceftriaxon (natriumzout).
- Oplosmiddel:** water voor injecties (aqua destillata)
- Klaarmaken:** 1 gram oplossen in 10 ml water voor injecties.
2 gram oplossen in 20 ml water voor injecties.
- Toediening i.v.** **1 gram als intraveneuze bolusinjectie:**
1 gram opgelost in 10 ml water voor injecties dient te worden toegediend in ten minste 2-4 minuten.

1, 2 of 4 gram als verdund infuus:

voeg de inhoud van de flacon toe aan 100 ml NaCl 0,9% en laat in ten minste 30 minuten inlopen.

Kortlopend infuus

1 ampul van 2000mg oplossen in 20 ml water voor injecties.
Benodigde hoeveelheid toevoegen aan 100 ml NaCl 0,9%
Inlooptijd 30 minuten
Naspoelen met 50ml NaCl 0.9%

Bolus

1 ampul van 2000 mg oplossen in 20 ml water voor injecties
Toedienen in 3-5 minuten
Voor en na flushen met 5 ml NaCl 0,9%

- Wet B.I.G.** Een directe intraveneuze bolusinjectie van dit middel is een handeling voorbehouden aan gespecialiseerde verpleegkundigen of artsen.

- Kans op flebitis** Flebitis na intraveneuze toediening kan worden verminderd door langzame injectie (gedurende 2-4 minuten). Na verdunning met 100 ml NaCl 0,9% is de osmolaliteit vrijwel gelijk aan die van serum, zodat de kans op pijn of flebitis niet groot is.

- Houdbaarheid** De oplossing in de injectieflacon is 12 uur bij kamertemperatuur en 24 uur in de koelkast houdbaar.

- Onverenigbaarheden:** Dit geneesmiddel niet toevoegen aan een infuus waarin al

een ander geneesmiddel zit. Het mag mogelijk wel via een zijlijn of via een kranenblok worden toegediend, samen met andere geneesmiddelen. Raadpleeg hiervoor de mengbaarheden documenten op de apotheeksite van ZIP.

Hulpstoffen geen