

De volgende symptomen kunnen wijzen op een mogelijke bijwerking:



### ALGEMEEN

- Ik heb het sneller koud dan gewoonlijk
- Ik heb koorts
- Ik ben aangekomen of afgevallen
- Ik voel me al langere tijd zeer moe



### HUID EN HAAR

- Ik heb huiduitslag of mijn huid jeukt
- Mijn huid krijgt een gelige kleur
- Ik krijg sneller bloedingen en blauwe plekken
- Ik zweet erger dan normaal
- Mijn haren vallen uit



### OGEN

- Ik heb problemen met mijn gezichtsvermogen
- Mijn oogwit kleurt geel



### MOND EN HOOFD

- Ik heb hoofdpijn die niet weg gaat of die voor mij ongebruikelijk is
- Ik voel me duizelig of ik ben flauwgevallen
- Ik heb meer dorst dan normaal (ik heb een droge mond)



### KEEL EN BORST

- Ik moet sinds kort hoesten of mijn hoesten is erger geworden
- Ik voel me kortademig
- Ik heb pijn op de borst
- Ik heb een versnelde hartslag
- Mijn stem is zwaarder geworden



### MAAG EN DARM

- Ik heb diarree of een frequentere ontlasting dan normaal
- Ik heb meer of minder honger dan normaal
- Ik ben misselijk en moet overgeven
- Ik heb obstipatie (verstopping)
- Mijn ontlasting is donker gekleurd, teerachtig, plakkerig of bevat bloed of slijm
- Ik heb hevige buikpijn / mijn maagstreek is gevoelig
- Mijn smaak is verstoord



### URINE

- De samenstelling en de kleur van mijn urine verandert (bijv. donkerder)



### SPIEREN EN GEWRICHTEN

- Mijn spieren doen pijn
- Ik verlies kracht in mijn spieren
- Mijn gewrichten doen pijn

## Uw contactgegevens

### Belangrijke contactgegevens

Mijn naam

Mijn telefoonnummer

In noodgeval contact opnemen met (naam en telefoonnummer)

Naam arts

Telefoonnummer

Spoednummer



MSD B.V. | Postbus 581 | 2003 PC Haarlem | Tel: 0800-9999000  
www.msdl.nl | www.msdoncology.nl | medicalinfo.nl@merck.com

Voor productvragen of het melden van bijwerkingen kunt u contact opnemen met 0800-9999 000 of medicalinfo.nl@merck.com.

N.B. Dit contact vervangt niet het advies van uw arts. Vragen over algemene medische onderwerpen of uw persoonlijke medische conditie kunnen wij niet beantwoorden.

## Uw dagboek bij gebruik pembrolizumab in combinatie met chemotherapie

Voor patiënten die behandeld worden met KEYTRUDA® (pembrolizumab, MSD), in combinatie met chemotherapie

Raadpleeg de volledige productinformatie, zie bijsluitertekst in de verpakking van KEYTRUDA® (pembrolizumab), alvorens pembrolizumab te gebruiken.

Als u pembrolizumab krijgt in combinatie met chemotherapie, lees ook de bijsluiter van deze geneesmiddelen.



# Over deze brochure




Deze brochure is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over uw behandeling en over mogelijke bijwerkingen die u kunt ervaren van de therapie met pembrolizumab en chemotherapie.

KEYTRUDA® (pembrolizumab) is een medicijn tegen kanker en valt onder de zogenoemde immuuntherapie. Immuuntherapie helpt het afweersysteem om kankercellen te herkennen en te vernietigen.

Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of de groei van kankercellen kunnen remmen.

Deze brochure vervangt niet het advies van uw arts. Voor vragen over algemene medische onderwerpen of uw persoonlijke medische conditie verwijzen wij u naar uw arts.

**Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.**



De volgende symptomen kunnen wijzen op een mogelijke bijwerking:



## ALGEMEEN

- Ik heb het sneller koud dan gewoonlijk
- Ik heb koorts
- Ik ben aangekomen of afgevallen
- Ik voel me al langere tijd zeer moe



## HUID EN HAAR

- Ik heb huiduitslag of mijn huid jeukt
- Mijn huid krijgt een gelige kleur
- Ik krijg sneller bloedingen en blauwe plekken
- Ik zweet erger dan normaal
- Mijn haren vallen uit



## OGEN

- Ik heb problemen met mijn gezichtsvermogen
- Mijn oogwit kleurt geel



## MOND EN HOOFD

- Ik heb hoofdpijn die niet weg gaat of die voor mij ongebruikelijk is
- Ik voel me duizelig of ik ben flauwgevallen
- Ik heb meer dorst dan normaal (ik heb een droge mond)



## KEEL EN BORST

- Ik moet sinds kort hoesten of mijn hoesten is erger geworden
- Ik voel me kortademig
- Ik heb pijn op de borst
- Ik heb een versnelde hartslag
- Mijn stem is zwaarder geworden



## MAAG EN DARM

- Ik heb diarree of een frequentere ontlasting dan normaal
- Ik heb meer of minder honger dan normaal
- Ik ben misselijk en moet overgeven
- Ik heb obstipatie (verstopping)
- Mijn ontlasting is donker gekleurd, teerachtig, plakkerig of bevat bloed of slijm
- Ik heb hevige buikpijn / mijn maagstreek is gevoelig
- Mijn smaak is verstoord



## URINE

- De samenstelling en de kleur van mijn urine verandert (bijv. donkerder)



## SPIEREN EN GEWRICHTEN

- Mijn spieren doen pijn
- Ik verlies kracht in mijn spieren
- Mijn gewrichten doen pijn

# Inhoud

1

**Over uw behandeling** > p.4

Pembrolizumab  
Chemotherapie

2

**Waar u op moet letten** > p.8

Mogelijke bijwerkingen

3

**Om bij te houden** > p.12

Uw behandeldagboek

4

**Veelgestelde vragen** > p.34

5


**Overzicht van symptomen die kunnen wijzen op een mogelijke bijwerking** > p.38

## Over uw behandeling

Uw arts heeft ervoor gekozen om u te behandelen met pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie. Zowel pembrolizumab als chemotherapie wordt in het ziekenhuis toegediend, via een infuus. Dan komt u volgens een afgesproken behandelingschema om de 3 weken naar het ziekenhuis. Via een infuus krijgt u de medicijnen toegediend, onder toezicht van een ervaren arts of verpleegkundige.



- Uw arts bespreekt met u hoeveel behandelingen u nodig heeft.



# Over uw behandeling met Pembrolizumab en chemotherapie

## Het immuunsysteem

Het menselijk lichaam beschikt over een afweersysteem. Het afweersysteem voorkomt dat je ziek wordt wanneer je in aanraking komt met indringers, zoals bacteriën en virussen. Het afweersysteem kan ook kankercellen herkennen en vernietigen. Een ander woord voor het afweersysteem is het immuunsysteem.

## De rol van het PD-1 en het PD-L1 eiwit

Het kan soms voorkomen dat het afweersysteem wel reageert, maar er toch niet in slaagt om de kankercellen op te ruimen. Dit kan komen doordat de kankercellen de werking van afweercellen remmen. Het PD-1 eiwit en het PD-L1 eiwit spelen hierbij een rol. Het PD-1 eiwit bevindt zich op de afweercellen, het PD-L1 eiwit bevindt zich op de kankercellen. Een tumor kan groeien doordat het PD-L1 eiwit op de kanker cel zich bindt aan het PD-1 eiwit op de afweercel. Door de binding kan de afweercel niet langer meer goed zijn werk doen. Het afweersysteem is nu minder goed in het herkennen van de kankercellen.

## Werkingsmechanisme pembrolizumab

Pembrolizumab is een anti-PD1 immuuntherapie. De naam zegt het al een beetje. Immuuntherapie in de vorm van een PD-1 remmer voorkomt de binding tussen het PD-1 eiwit en het PD-L1 eiwit op de kanker cel. Doordat de binding niet meer tot stand komt, wordt de kanker cel weer herkenbaar voor het afweersysteem. De werking van het afweersysteem wordt nu dus niet langer meer geremd. Immuuntherapie stimuleert dus het eigen immuunsysteem om de kanker cel te herkennen en te vernietigen, met als mogelijk resultaat afname van de tumor.

De bijwerkingen van immuuntherapie met pembrolizumab zijn anders dan die van chemotherapie. Immuuntherapie kan voor het versterken van afweerreacties zorgen en soms kan dit leiden tot

afweerreacties gericht tegen het eigen lichaam (auto-immuniteit). Het afweersysteem wordt immers sterk gestimuleerd door de immuuntherapie. U kunt hierdoor last krijgen van bijvoorbeeld een griepig gevoel, darmontstekingen met diarree als gevolg, of huidontstekingen in de vorm van uitslag. Behandelingen met medicijnen die het afweersysteem remmen kunnen soms nodig zijn om dit soort bijwerkingen te behandelen.

## Wat u moet weten over chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen.

De meeste tumorcellen delen snel. Chemotherapie werkt vooral op cellen die snel delen. Daardoor kunnen diverse bijwerkingen optreden, zoals vermoeidheid, koorts, infecties, misselijkheid, braken, diarree, verstopping, haarverlies en een droge huid.

## Over de combinatie Pembrolizumab en chemotherapie

Uw arts heeft u een combinatie van pembrolizumab en chemotherapie (pemetrexed, carboplatine of cisplatine) voorgeschreven. Over het algemeen is de frequentie van bijwerkingen bij pembrolizumabcombinatietherapie hoger dan bij pembrolizumabmonotherapie of alleen chemotherapie, wat een afspiegeling is van de bijdrage van elk van deze componenten. Het is belangrijk dat u ook de bijsluiters leest van deze geneesmiddelen. Neem contact op met uw arts als u vragen heeft over pemetrexed, carboplatine of cisplatine.

## Waar u op moet letten


Zoals elk medicijn kan ook dit geneesmiddel (ernstige) bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet nader genoemd worden in dit dagboek. Daarom is het zeer belangrijk dat u alert bent op mogelijke bijwerkingen.

Als u een bijwerking opmerkt, moet u onmiddellijk uw arts bellen of bezoeken. Uw arts zal u mogelijk andere geneesmiddelen geven om nog ernstigere complicaties te voorkomen en de verschijnselen te verminderen.

De meest frequent gemelde bijwerkingen van pembrolizumab in combinatie met chemotherapie zijn: misselijkheid, bloedarmoede, vermoeidheid, problemen met immuniteit, verminderde eetlust, diarree en braken.

In de bijsluiters van pembrolizumab en de chemotherapie vindt u een uitgebreid overzicht van mogelijke bijwerkingen.

U kunt van uw arts ook een klein kaartje krijgen waarop staat dat u behandeld wordt met pembrolizumab. Dit kunt u bij u dragen in bijvoorbeeld uw portemonnee. Mocht u last krijgen van een bijwerking, dan kunt u dit kaartje tonen aan de arts.



**In het behandeldagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.**

## Waar u op moet letten

De volgende symptomen kunnen wijzen op een mogelijke bijwerking.



### ALGEMEEN

- Ik heb het sneller koud dan gewoonlijk
- Ik heb koorts
- Ik ben aangekomen of afgevallen
- Ik voel me al langere tijd zeer moe



### HUID EN HAAR

- Ik heb huiduitslag of mijn huid jeukt
- Mijn huid krijgt een gelige kleur
- Ik krijg sneller bloedingen en blauwe plekken
- Ik zweet erger dan normaal
- Mijn haren vallen uit




### OGEN

- Ik heb problemen met mijn gezichtsvermogen
- Mijn oogwit kleurt geel



### MOND EN HOOFD

- Ik heb hoofdpijn die niet weggaat of die voor mij ongebruikelijk is
- Ik voel me duizelig of ik ben flauwgevallen
- Ik heb meer dorst dan normaal (ik heb een droge mond)



### KEEL EN BORST

- Ik moet sinds kort hoesten of mijn hoesten is erger geworden
- Ik voel me kortademig
- Ik heb pijn op de borst
- Ik heb een versnelde hartslag
- Mijn stem is zwaarder geworden



### MAAG EN DARM

- Ik heb diarree of een frequentere ontlasting dan normaal
- Ik heb meer of minder honger dan normaal
- Ik ben misselijk en moet overgeven
- Ik heb obstipatie (verstopping)
- Mijn ontlasting is donker gekleurd, teerachtig, plakkerig of bevat bloed of slijm
- Ik heb hevige buikpijn / mijn maagstreek is gevoelig
- Mijn smaak is verstoord



### URINE

- De samenstelling en de kleur van mijn urine verandert (bijv. donkerder)



### SPIEREN EN GEWRICHTEN

- Mijn spieren doen pijn
- Ik verlies kracht in mijn spieren
- Mijn gewrichten doen pijn

# 3

## Om bij te houden

### Instructies bij het behandeldagboek

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk uw arts informeert bij een bijwerking. Dit dagboek kunt u gebruiken tijdens uw gesprekken met uw arts. Het helpt u bij te houden wat er is gebeurd en hoe u zich heeft gevoeld tijdens de therapie.

UW BIJWERKINGEN	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
GEEN BIJWERKINGEN	X				X	X	X
		X					
			X	X			

In het behandeldagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.

### TOELICHTING

(Vul hier nadere informatie in)

Empty text boxes for providing further information.

### HOE HEEFT U ZICH DEZE WEEK GEVOELD? (1=ZEER SLECHT; 6=ZEER GOED)

1 2 3 ~~4~~ 5 6

### VOELDE U ZICH DEZE WEEK BETER OF SLECHTER DAN DE VORIGE WEEK?

~~BETER~~

SLECHTER

### OPMERKINGEN

Large empty text area for notes.



# 3

## Behandeldagboek

(Week 1, eerste toediening pembrolizumab en chemotherapie)

Datum eerste dag van de week \_\_\_\_\_

UW BIJWERKINGEN	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
GEEN BIJWERKINGEN							
ANDERE BIJWERKINGEN							

In het behandeldagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.

### TOELICHTING

(Vul hier nadere informatie in)

Empty text boxes for providing additional information.

HOE HEEFT U ZICH DEZE WEEK GEVOELD? (1=ZEER SLECHT; 6=ZEER GOED)

1 2 3 4 5 6

VOELDE U ZICH DEZE WEEK BETER OF SLECHTER DAN DE VORIGE WEEK?

BETER

SLECHTER

### OPMERKINGEN

Empty text box for notes.

# 3 Behandel dagboek

(Week 2)

Datum eerste dag van de week \_\_\_\_\_

UW BIJWERKINGEN	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
GEEN BIJWERKINGEN							
ANDERE BIJWERKINGEN							

In het behandel dagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.

**TOELICHTING**  
(Vul hier nadere informatie in)

**HOE HEEFT U ZICH DEZE WEEK GEVOELD? (1=ZEER SLECHT; 6=ZEER GOED)**

1 2 3 4 5 6

**VOELDE U ZICH DEZE WEEK BETER OF SLECHTER DAN DE VORIGE WEEK?**

**BETER** **SLECHTER**

**OPMERKINGEN**

# 3 Behandel dagboek

(Week 3)

Datum eerste dag van de week \_\_\_\_\_

UW BIJWERKINGEN	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
GEEN BIJWERKINGEN							
ANDERE BIJWERKINGEN							

In het behandel dagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.

**TOELICHTING**  
(Vul hier nadere informatie in)

**HOE HEEFT U ZICH DEZE WEEK GEVOELD? (1=ZEER SLECHT; 6=ZEER GOED)**

1 2 3 4 5 6

**VOELDE U ZICH DEZE WEEK BETER OF SLECHTER DAN DE VORIGE WEEK?**

**BETER** **SLECHTER**









**OPMERKINGEN**

# 3

## Behandeldagboek

(Week 4, tweede toediening pembrolizumab en chemotherapie)

Datum eerste dag van de week \_\_\_\_\_

UW BIJWERKINGEN	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
GEEN BIJWERKINGEN							
							
							
							
							
							
							
							
							
ANDERE BIJWERKINGEN							

In het behandeldagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.

### TOELICHTING

(Vul hier nadere informatie in)

HOE HEEFT U ZICH DEZE WEEK GEVOELD? (1=ZEER SLECHT; 6=ZEER GOED)

1 2 3 4 5 6

VOELDE U ZICH DEZE WEEK BETER OF SLECHTER DAN DE VORIGE WEEK?

BETER

SLECHTER

### OPMERKINGEN

# 3 Behandel dagboek

(Week 5)

Datum eerste dag van de week \_\_\_\_\_

UW BIJWERKINGEN	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
GEEN BIJWERKINGEN							
ANDERE BIJWERKINGEN							

In het behandel dagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.

**TOELICHTING**  
(Vul hier nadere informatie in)

**HOE HEEFT U ZICH DEZE WEEK GEVOELD? (1=ZEER SLECHT; 6=ZEER GOED)**

1 2 3 4 5 6

**VOELDE U ZICH DEZE WEEK BETER OF SLECHTER DAN DE VORIGE WEEK?**

**BETER** **SLECHTER**

**OPMERKINGEN**

# 3 Behandel dagboek

(Week 6)

Datum eerste dag van de week \_\_\_\_\_

UW BIJWERKINGEN	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
GEEN BIJWERKINGEN							
ANDERE BIJWERKINGEN							

In het behandel dagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.

**TOELICHTING**  
(Vul hier nadere informatie in)

**HOE HEEFT U ZICH DEZE WEEK GEVOELD? (1=ZEER SLECHT; 6=ZEER GOED)**

1 2 3 4 5 6

**VOELDE U ZICH DEZE WEEK BETER OF SLECHTER DAN DE VORIGE WEEK?**

**BETER** **SLECHTER**

**OPMERKINGEN**

# 3

## Behandeldagboek

(Week 7, derde toediening pembrolizumab en chemotherapie)

Datum eerste dag van de week \_\_\_\_\_

UW BIJWERKINGEN	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
GEEN BIJWERKINGEN							
ANDERE BIJWERKINGEN							

In het behandeldagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.

### TOELICHTING

(Vul hier nadere informatie in)

HOE HEEFT U ZICH DEZE WEEK GEVOELD? (1=ZEER SLECHT; 6=ZEER GOED)

1

2

3

4

5

6

VOELDE U ZICH DEZE WEEK BETER OF SLECHTER DAN DE VORIGE WEEK?

BETER

SLECHTER

### OPMERKINGEN

# 3

## Behandeldagboek

(Week 8)

Datum eerste dag van de week \_\_\_\_\_

UW BIJWERKINGEN	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
GEEN BIJWERKINGEN							
ANDERE BIJWERKINGEN							

In het behandeldagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.

**TOELICHTING**  
(Vul hier nadere informatie in)

**HOE HEEFT U ZICH DEZE WEEK GEVOELD? (1=ZEER SLECHT; 6=ZEER GOED)**

1 2 3 4 5 6

**VOELDE U ZICH DEZE WEEK BETER OF SLECHTER DAN DE VORIGE WEEK?**

**BETER** **SLECHTER**

**OPMERKINGEN**



# 3 Behandel dagboek

(Week 9)

Datum eerste dag van de week \_\_\_\_\_

UW BIJWERKINGEN	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
GEEN BIJWERKINGEN							
ANDERE BIJWERKINGEN							

In het behandel dagboek kunt u bijwerkingen noteren. Mocht u tijdens het gebruik van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, merken dat u last krijgt van een bijwerking, meld dit dan direct bij uw behandelteam. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.

## TOELICHTING

(Vul hier nadere informatie in)

HOE HEEFT U ZICH DEZE WEEK GEVOELD? (1=ZEER SLECHT; 6=ZEER GOED)

1

2

3

4

5

6

VOELDE U ZICH DEZE WEEK BETER OF SLECHTER DAN DE VORIGE WEEK?

BETER

SLECHTER

## OPMERKINGEN



# 4

## Veelgestelde vragen\*

In dit hoofdstuk wordt een aantal veel voorkomende vragen beantwoord. Het is zinvol eventuele andere vragen die u heeft in het dagboek op te schrijven, zodat u deze kunt stellen bij uw volgende afspraak met uw arts.

### **Kan ik nog andere geneesmiddelen gebruiken naast pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie?**

Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt die uw immuunsysteem verzwakken. Voorbeelden hiervan zijn corticosteroïden zoals prednison. Deze geneesmiddelen kunnen het effect van pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, beïnvloeden. Echter, als u eenmaal met pembrolizumab, in combinatie met chemotherapie, behandeld wordt, kan uw arts u corticosteroïden geven om de bijwerkingen te verminderen die u van pembrolizumab en chemotherapie kunt ondervinden.

Gebruikt u naast pembrolizumab en chemotherapie nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel het uw arts.

### **Kan ik op vakantie gaan?**

Bespreek en stem uw vakantieplannen af met uw arts.

Het is raadzaam dat u de informatie van uw behandeling meeneemt tijdens uw vakantie. Draag uw patiëntenkaartje met de contactgegevens van uw arts bij u, zodat deze in noodgevallen kan worden bereikt. Daarnaast bevat het patiëntenkaartje belangrijke informatie over mogelijke bijwerkingen van de therapie.

### **Mag ik alcohol drinken?**

Alcohol moet net als altijd met mate worden geconsumeerd. Dit geldt ook tijdens de behandeling met pembrolizumab en chemotherapie.

\* De antwoorden op deze vragen hebben alleen betrekking op een behandeling met pembrolizumab. Het is belangrijk om ook de bijsluiters van de andere geneesmiddelen te lezen en/of uw arts of apotheker te raadplegen.



5

## Overzicht van symptomen die kunnen wijzen op een mogelijke bijwerking

**Vouw als hulpmiddel de rechterkant uit wanneer u het dagboek invult.**