

Röntgenonderzoek

Slokdarm, maag en twaalfvingerige
darm

Binnenkort krijgt u een röntgenonderzoek van de slokdarm of de maag/twaalfvingerige darm. Bij dit onderzoek kijkt de radioloog naar de slokdarm en het bovenste gedeelte van de maag.

Om deze organen zichtbaar te maken voor röntgenstraling wordt er gebruik gemaakt van contrastmiddel. In deze folder kunt u lezen wat er gebeurt bij dit onderzoek en waar u aan moet denken.

Waar u aan moet denken?

- Als u overgevoelig bent voor contrastvloeistof of jodium, wilt u dit dan vóór het onderzoek melden aan de laborant?
- Als u zwanger bent of denkt te zijn, wilt u dit dan vóór het onderzoek melden aan de laborant?
- Tijdens het onderzoek mag u een T-shirt of hemd aanhouden. Een bril, beha, oorbellen, kettingen en een kunstgebit moeten uit en/of afgedaan worden.

Vorbereiding

- *Volwassenen:* U dient op de dag van het onderzoek vanaf 0.00 uur 's nachts tot na het onderzoek volledig nuchter te zijn (niet eten, drinken of roken) Bij medicijngebruik kunt u uw medicijnen met één slokje water innemen.
- *Kinderen van 0 tot 4 jaar:* De laatste voeding dient minimaal 4 tot 5 uur voor het onderzoek gegeven zijn.
- *Kinderen van 4 tot 18 jaar:* Zie volwassenen.

Dag van het onderzoek

U meldt zich 5 minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie van de afdeling radiologie. De afdeling is te vinden op vleugel A, eerste verdieping, bestemming 41.

Datum:dag /...../20.....
Tijd onderzoek: uur, Ede.
Aanwezig:.....uur, Ede.

Nadat u zich gemeld heeft, wacht u in de wachtruimte tot een laborant u komt halen. De laborant wijst u de kleedruimte en geeft aan welke kledingstukken u voor het onderzoek uit moet doen. De laborant haalt u op uit de kleedruimte.

Het onderzoek: slokdarm

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog, geassisteerd door de laborant.

In de onderzoekskamer komt u tegen het bed van het röntgenapparaat te staan. U krijgt een beker contrastmiddel (bariumpap) waarvan u een slok in de mond neemt. U wacht met doorslikken tot de radioloog aangeeft dat u mag slikken. Tijdens het slikken volgt de radioloog het contrastmiddel via de slokdarm naar de maag door het maken van foto's. De foto's worden vanuit verschillende richtingen gemaakt. Dit kan zowel staand als liggend gebeuren. U zult hiervoor in verschillende richtingen moeten draaien.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Door het gebruik van bariumpap kan de ontlasting de eerste dagen wit gekleurd zijn. Dit is gebruikelijk. Eventueel kan de bariumpap harde ontlasting veroorzaken. Het is daarom belangrijk om de eerste dagen na het onderzoek goed te drinken, ongeveer één liter extra per dag.

Uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft zijn bevindingen door aan de behandelend arts of huisarts. De uitslag van de behandelend arts krijgt u tijdens een vervolgspraak. Bij de huisarts duurt het ongeveer 4 dagen voordat deze binnen is.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u die dan gerust aan de laborant. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden. U kunt ook op werkdagen bellen naar de afdeling radiologie.

Indien u bent verhinderd, verzoeken wij u dit tijdig (twee werkdagen van tevoren) door te geven.

Afspraken en informatie

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur, tel. (0318) 43 39 00.