

RS-virus infectie

Uw kind is in een apart kamertje opgenomen omdat hij/zij misschien een een luchtweginfectie heeft, veroorzaakt door het RS-virus.

RS-virus is de afkorting van Respiratoir Syncytieel Virus. Dit virus veroorzaakt een infectie van de longen en de bovenste luchtwegen. Het RS-virus kan bij iedereen voorkomen. Bij volwassenen en bij veel kinderen veroorzaakt dit RS-virus een lichte verkoudheid. Jonge kinderen en baby's kunnen van dit virus ernstig ziek worden.

Bij baby's tot een half jaar zorgt het virus voor kortademigheid en grauw zien. Ook kunnen ze niet goed meer drinken, gaan erg hoesten, slijm opgeven en daardoor ook braken. Door dit alles zal de conditie van de baby verslechteren en is een opname noodzakelijk.

Hoe gevaarlijk is het RS-virus?

Risicofactoren voor het krijgen van een ernstige RS-virus infectie zijn:

- vroeggeboorte
- een chronische longaandoening
- een slecht functionerend afweersysteem

Kinderen met een risicofactor hebben meer kans om opgenomen te worden. De gevolgen van een ernstige RS-virus infectie op de langere termijn zijn niet goed bekend. Een aantal kinderen houdt jarenlang restverschijnselen, zoals een verminderde longfunctie en benauwdheid.

Hoe vindt besmetting plaats?

Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen door:

- direct contact door bijvoorbeeld knuffelen of zoenen
- verspreiding via de lucht door niezen en hoesten

Het RS-virus komt voor rond de herfstperiode tot laat in het voorjaar, met name in ruimtes waarin zich veel mensen bevinden, zoals kinderdagverblijven en in wachtkamers. Verder kan het RS-virus urenlang overleven, bijvoorbeeld op een gebruikt zakdoekje. Een kind kan verschillende keren het RS-virus oplopen het kan er dus niet immuun voor worden.

Hoe wordt het RS-virus behandeld?

Uw kind wordt opgenomen in een apart kamertje. Bij kinderen met een verminderde conditie kan een voedingssonde nodig zijn, zodat ze dan minder zelf hoeven te drinken. Soms kan behandeling met zuurstof noodzakelijk zijn.

Maatregelen voor ouders en bezoek

De volgende regels helpen besmetting met het RS-virus te voorkomen:

- draag een neus-mondmasker indien u zelf kleine kinderen heeft (geldt niet voor ouders)
- desinfecteer de handen voordat u het kind aanraakt
- kom niet op bezoek in geval van verkoudheid of koorts
- houdt andere kleine kinderen uit de buurt van het zieke kind
- bij het verlaten van de kamer de handen desinfecteren met handdesinfectans

Vragen

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze folder, dan kunt u daarvoor terecht bij de verpleegkundige die uw kind verzorgt.