

# Opheffen vernauwing in de plasbuis

**De uroloog gaat een vernauwing in de plasbuis opheffen. Door de vernauwing weg te nemen worden de plasklachten en/of urineweginfecties opgeheven.**

### **Vorbereiding**

Indien u bloedverduunners gebruikt dient u deze in overleg met de uroloog voorafgaand aan het onderzoek te stoppen. Het aantal dagen is afhankelijk van het type bloedverdunner dat u gebruikt.

### **Dag van de behandeling**

Er zijn geen andere voorbereidingen nodig dan hierboven vermeld. U moet er rekening mee houden dat u na het onderzoek rustig aan moet doen. Laat grote inspanningen achterwege in verband met mogelijke nabloeding. Na de ingreep kunt u zelf niet deelnemen aan het verkeer.

### **De ingreep**

Nadat u op de onderzoeksbank heeft plaatsgenomen verdooft de uroloog u plaatselijk. Bij de vrouw gaat dat met twee injecties bij het uiteinde van de plasbuis en bij de man wordt meestal een verdovende gel direct in de plasbuis gespoten en soms een lokale verdoving rondom de basis van de penis.

Vrouwen kunnen door de verdovingsprik soms wat duizelig worden. Dit is altijd maar van korte duur.

Aansluitend vindt de ingreep plaats door middel van het inbrengen van een speciaal instrument in de plasbuis, dat een inkerving in de plasbuis maakt, zodat er meer ruimte ontstaat. Om te voorkomen dat de vernauwing na de ingreep terugkomt en de wond de kans te geven te herstellen, krijgt u gedurende één à twee dagen een katheter.

## **Na de behandeling**

U krijgt van de polikliniekassistent instructies hoe u de komende dag(en) met de katheter dient om te gaan. Ook krijgt u een afspraak voor het verwijderen van de katheter.

Tevens krijgt u van de polikliniekassistent een verbandje in uw ondergoed om uw kleding te beschermen bij eventuele nabloeding. Het is normaal dat er gedurende enkele dagen wat bloed bij de urine zit. Drink daarom tenminste 1 liter extra, zodat de blaas goed gespoeld wordt.

Op de dag dat de katheter wordt verwijderd, krijgt u van de polikliniekassistent preventief een antibioticum. Dit is noodzakelijk om infectie te voorkomen.

Nadat de katheter verwijderd is kan er gedurende enkele dagen ook een branderig gevoel optreden tijdens het plassen. Ook hier geldt weer: hoe meer u drinkt, hoe minder geconcentreerd de urine is en hoe eerder de klachten zullen afnemen. Hervat het gebruik van de bloedverdunners pas als de urine helder is.

## **Vragen**

Als u vragen heeft over het onderzoek, stelt u ze dan gerust aan de polikliniekassistent die bij de behandeling aanwezig is. Kijk voor aanvullende informatie op internet: [www.urolog.nl](http://www.urolog.nl)

U kunt op werkdagen tussen 08.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 uur bellen naar de polikliniek urologie, (0318) 43 51 00.